

硬脊膜外麻醉或脊椎麻醉后须知

因疼痛管理或手术需要，你接受了硬脊膜外麻醉（即无痛分娩针）及/或脊椎麻醉。在非常罕见的情况下，这疗程可能会出现严重问题，但若能及早发现，可以施以治疗。

如果你察觉以下情况，请立即致电我们或直接到急诊部：

- 在接受无痛分娩针或脊椎麻醉的部位出现疼痛、发热、红肿或渗液。这情况可能会维持不变或会变坏，亦有可能延展到臀部
- 在腿部或臀部出现无力、麻木或针刺感觉
- 不明原因的高烧
- 大小便失禁

及/或如果你出现以下的头痛情况，

- 在接受无痛分娩针或脊椎麻醉后大约二天，开始出现持续性头痛
- 服用一般止痛剂，补充液体及休息也不能止痛
- 坐下及站立时，疼痛变坏，躺下时会较舒服
- 可以同时出现颈部僵硬或听觉起变化如耳鸣、耳堵。

如果你有上述征状，请与你的医院联络，电话如下：

Mercy 妇女医院, Heidelberg:

电话：8458 4444

要求转接急诊麻醉医生 内线 4118。

他们是 24 小时当值。

Werribee Mercy 医院:

请联系

电话：03 8754 6325

一周7天，全天24小时开放

Acknowledgements

Produced by: Acute Pain Service and Anaesthetic Department

Date produced: November 2014

Date of last review: July 2021

Date for review: December 2022

这份文件仅提供常规信息，不可替代专业医疗人员针对您健康状况给出的建议。如果您对自身的情况有任何疑问，应当向专业医疗人员寻求帮助。