

توصیه برای بعد از بی حسی اپیدورال یا بی حسی نخاعی (اسپاینال)

شما برای کنترل درد و یا کمک به انجام عمل جراحی خود بی حسی اپیدورال و یا بی حسی نخاعی داشته اید. در حالی که مشکلات می توانند جدی باشند، آنها بسیار نادر بوده و در صورت تشخیص زود هنگام می توانند درمان شوند.

لطفا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر به ما تلفن کنید و یا به بخش اورژانس بیاوید:

- درد، گرما، تورم یا ترشح در ناحیه ای که اپیدورال یا بی حسی نخاعی را دریافت کرده اید که ممکن است به همان شکل باقی بماند یا بدتر شود و ممکن است به سمت باسن برود یا نرود.
- ضعف، بی حسی یا احساس سوزن سوزن شدن در پاها یا باسن
- درجه حرارت بالا در بدن به علت ناشناخته
- از دست دادن کنترل مثانه یا روده

و/یا اگر سردردی دارید که:

- حدود 2 روز پس از اپیدورال یا بی حسی نخاعی شروع شده و همواره وجود دارد
- با مصرف مسکن ملایم، مایعات و استراحت از بین نمی رود
- زمانی که می نشینید یا می ایستید بدتر می شود و زمانی که دراز می کشید احساس بهتری دارید
- ممکن است با سفتی گردن یا تغییرات شنوایی مانند زنگ زدن یا گرفتگی گوش همراه باشد

اگر هر کدام از علائم ذکر شده در بالا را دارید لطفاً با ما از طریق زیر تماس بگیرید:

بیمارستان مرسی وریبی (Werribee Mercy Hospital)	بیمارستان زنان مرسی هایدلبرگ (Mercy Hospital for Women, Heidelberg)
تلفن: 03 8754 6325	تلفن: 8458 4444
لطفاً با خط زیر تماس بگیرید:	درخواست کنید تا با دکتر بیهوشی اورژانس به شماره داخلی 4118 وصل شوید.
آنها 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس هستند.	آنها 24 ساعت شبانه روز در دسترس هستند.

Acknowledgements

Produced by: Acute Pain Service and Anaesthetic Department

Date produced: November 2014

Date of last review: January 2023

Date for review: January 2025

این برگه فقط اطلاعات کلی را ارائه می دهد و جایگزین توصیه های پزشک معالج در رابطه با سلامتی شما نیست. اگر در مورد سلامتی خود نگران هستید باید آن را با پزشک متخصص در میان بگذارید.