



Mercy Health
Care first

PERSIAN – Advice after your epidural or spinal

توصیه برای بعد از بی حسی اپیدورال یا بی حسی نخاعی (اسپاینال)

شما برای کنترل درد و یا کمک به انجام عمل جراحی خود بی حسی اپیدورال و یا بی حسی نخاعی داشته اید. در حالی که مشکلات می توانند جدی باشند، آنها بسیار نادر بوده و در صورت تشخیص زود هنگام می توانند درمان شوند.

لطفا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر به ما تلفن کنید و یا به بخش اورژانس بیایید:

- درد، گرما، تورم یا ترشح در ناحیه ای که اپیدورال یا بی حسی نخاعی را دریافت کرده اید که ممکن است به همان شکل باقی بماند یا بدتر شود و ممکن است به سمت باسن برود یا نرود.
- ضعف، بی حسی یا احساس سوزن سوزن شدن در پاها یا باسن
- درجه حرارت بالا در بدن به علت ناشناخته
- از دست دادن کنترل مثانه یا روده

و/یا اگر سردردی دارید که:

- حدود 2 روز پس از اپیدورال یا بی حسی نخاعی شروع شده و همواره وجود دارد
- با مصرف مسکن ملایم، مایعات و استراحت از بین نمی رود
- زمانی که می نشینید یا می ایستید بدتر می شود و زمانی که دراز می کشید احساس بهتری دارید
- ممکن است با سفتی گردن یا تغییرات شنوایی مانند زنگ زدن یا گرفتگی گوش همراه باشد

اگر هر کدام از علائم ذکر شده در بالا را دارید لطفاً با ما از طریق زیر تماس بگیرید:

بیمارستان مرسی وریبی

(Werribee Mercy Hospital)

دوشنبه تا جمعه 8:00 صبح تا 4:30 بعد از ظهر

پرستار درد حاد

تلفن: 8754 3086

یا

دوشنبه تا جمعه 8:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر

متخصص بیهوشی کشیک

تلفن: 8754 3026

خارج از ساعات اداری شامل آخر هفته ها و تعطیلات

رسمی:

متخصص بیهوشی کشیک: 8754 3026

بیمارستان زنان مرسی هایدلبرگ

(Mercy Hospital for Women, Heidelberg)

تلفن: 8458 4444

درخواست کنید تا با دکتر بیهوشی اورژانس به شماره داخلی 4118 وصل شوید.

آنها 24 ساعت شبانه روز در دسترس هستند.

با تشکر از

ناشر: خدمات درد حاد و واحد بیهوشی

تاریخ چاپ: نوامبر 2014

تاریخ آخرین بررسی: دسامبر 2020

تاریخ بررسی بعدی: دسامبر 2022

این برگه فقط اطلاعات کلی را ارائه می دهد و جایگزین توصیه های پزشک معالج در رابطه با سلامتی شما نیست. اگر در مورد سلامتی خود نگران هستید باید آن را با پزشک متخصص در میان بگذارید.